

Maximale
Vorsichtsmaßnahmen!

Vorsicht vor hochpathogener Vogelgrippe!

Um den Ausbruch zu verhindern, ist es sehr wichtig, dass jeder einzelne Mitarbeiter gründlich die Maßnahmen durchführt!!

- ① Maßnahmen zur Verhinderung von Eindringen wilder Tiere wie Wildvögel, Ratten und sonstiges
- Intensivieren Sie die **Reinigung und Desinfektion** innerhalb des Bauernhofs und in der Umgebung von dem Geflügelstall

In der Nähe von Teichen und sonstigem gründlich desinfizieren!



- **Führen Sie im Hühnerstall eine Inspektion durch und vergewissern Sie sich, dass es keinen Einbruchsweg für wilde Tiere gibt.**

Falls Sie ein Loch und sonstiges entdecken sollten, müssen Sie es dem Gesundheitsbeauftragten für die Zucht mitteilen.



Der Drahtzaun am Hühnerstall ist beschädigt



Ein Loch ist an der Wand von dem Hühnerstall vorhanden



Es kann auch vorkommen, dass eine Katze durch einen Spalt an der Eiersammellinie eindringt!

- ② Bitte achten Sie darauf, dass beim Betreten oder Verlassen des Hühnerstalls gründlich die **Desinfektion durchgeführt wird und die Stiefel gewechselt werden.**



Einrichten von Stiefeln, die nur für die Benutzung vom Hühnerstall bestimmt sind

- ③ Bitte entfernen Sie zuerst gründlich den **Dreck** von den **Stiefeln** und dann **desinfizieren** Sie sie. **Das Desinfektionsmittel** in dem Desinfektionsbecken am Eingang **soll man jeden Tag (wenn es schmutzig geworden ist, jedes Mal) auswechseln**



Erst den Dreck entfernen, dann desinfizieren



Das Desinfektionsmittel auswechseln

Bitte beobachten Sie gründlich den Gesundheitszustand im Hühnerstall. Falls Sie irgendwelche Ungewöhnlichkeiten entdeckt haben, benachrichtigen Sie sofort das nächstliegende Gesundheitszentrum für häusliche Nutztiere.

